


Traitement du rétrécissement de la valve aortique par voie percutanée (TAVI)



Service de cardiologie

Hôpital de Sion

Centre Hospitalier du Valais Romand



Hôpital du Valais
Spital Wallis

www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch

TAVI

Transcatheter aortic valve implantation (TAVI)

Implantation d'une valve aortique biologique par voie percutanée, c'est-à-dire en passant par une artère de la jambe ou du cou, sans ouverture du thorax.

Type de prothèse utilisée



Procédure TAVI

- **Hospitalisation** : le jour même ou la veille
- **Voie d'abord** : le plus souvent au pli de l'aîne/artère fémorale (+ voie accessoire au poignet/artère radiale)
- **Anesthésie** : sédation et anesthésie loco – régionale
- **Complications éventuelles** :
 - Troubles du rythme cardiaque corrigés par l'implantation d'un stimulateur cardiaque.
 - Complications au point de ponction (saignement ou sténose) traitées le plus souvent par la pose d'un stent ou plus rarement, par une intervention chirurgicale.
 - Accident vasculaire cérébral

Lien sur la vidéo explicative TAVI



Suites

- Immédiates :
 - 1 heure en salle de réveil
 - Lever à la 4^{ème} heure
 - Séjour aux soins continus de 1 à 3 jours
 - Retour à domicile possible après 2-3 jours
 - Habituellement, pas besoin de convalescence
- À domicile :
 - Reprise immédiate de vos activités
 - Consultation 1 à 2 mois après l'intervention (TAVI) auprès de votre cardiologue traitant
 - Prévention de l'endocardite infectieuse (prise d'antibiotiques lors de soins dentaires)

Contact

Infirmière de coordination cardiologie
+41 27 603 46 95
sion.coronarographie@hopitalvs.ch



Hôpital du Valais
Hôpital de Sion
Av. du Grand-Champsec 80
1951 Sion