

28.09.2017

Clinique romande
de réadaptation



Lombalgies chroniques du sujet âgé

Quel bilan effectuer et premières mesures

suvacare

Prestations et réadaptation

Dr G. Rivier, dir med CRR

Epidémiologie > 65 ans

Fréquente

F > H

Caractères douleur = 20-60 ans

Spécifique – non spécifique

Formes sévères ↗ avec âge (?)

Dépression - chronicité

Fractures OP, tumeurs, infections, CLE

Sciatique > lombalgie – ↘ qualité de vie

Personne 60 ≠ 80 ≠ 90

Comorbidités:

- état physique (muscles, os, hanches, neuro, cœur et artères, diabète, HTA...),
- état cognitif et humeur

Conditions de vie:

- domicile/maison de retraite
- Famille/seul

Niveau d'activité, d'indépendance

Attentes

Histoire naturelle de l'affection


TTT des chroniques palliatifs >> curatifs


Tolérance/risques des médicaments

Effet de la rééducation, moyens auxiliaires

Chirurgie simple/complexe – complications (durée op, instrumentation, pertes sang)







Troubles dégénératifs

Prévalence élevée

Corrélation radio-clinique?

Discarthrose érosive

Pincements intersomatiques sévères et étagés

Arthrose interapophysaire en poussée


Modic 1

Spondylolisthesis instable


 Coxarthrose


Jusqu'où pousser les investigations ?

Implication ttt

























Troubles dégénératifs et douleur radiculaire

Sténose trou de conjugaison

Spondylolisthesis dégénératif

Kyste arthro-synovial provoquant un conflit radiculaire



HD



CLE



RX debout, IRM (CT)


RX fonctionnelles si spondylolisthesis



Implication ttt





















Schizas (IRM), Spine 2010



Principaux facteurs à prendre en considération en faveur du traitement médical

Éléments	En faveur traitement médical
Lombalgie	Prédominante
Radiculalgie	Non prédominante
Diagnostic	Incertain
Retentissement	Peu important
Complication neurologiques	Non
Durée symptomatologie	Courte
Traitements antérieurs	Non ou mal utilisés
Interventions antérieures	Oui
Co-morbidités augmentant risque opératoire	Importantes
Dépression	Présente
Préférence du patient	Traitement médical
Données anatomiques	Complexe (présence de lésions associées (scoliose, spondylolisthesis, hypermobilité préopératoire ou postopératoire probable. . .) Mauvaise corrélation anatomoclinique

PM : périmètre de marche.



Troubles de la posture

Réversible ou non


CLE

Examen neurologique



Mécanisme de compensation dépassé ou non

RX rachis total en charge
EOS, IRM, CT

ttt en conséquence











Patient before and after surgery.




Syndrome de la tête tombante irréductible (osseux) – Bechterew ossifié



Une des conséquences de l'ostéoporose



tassement
des vertèbres



Scoliose dégénérative apparue à l'âge adulte

Scoliose dégénérative «de novo» commence à 50ans et évolue en moyenne $+ 1.65^{\circ}$ /an

70% des scoliose idiopathique de l'adolescent (Cobb $>30^{\circ}$ rotation $>33\%$) non opérée s'aggrave à l'âge adulte de $\geq 5^{\circ}$ (en moyenne $+ 0.82^{\circ}$ / an)

Dislocation vertébrale!



Equilibre sagittal







Pourquoi l'équilibre sagittal est-il si important ?

- L'équilibre idéal ou économique permet la position érigée avec le moins de dépenses énergétiques
 - L'ignorance du plan sagittal a créé ou exacerbé une série de problèmes cliniques difficiles:
 - Dégénérescence discale jonctionnelle
 - Arrachement de matériel, surtout à la partie haute du montage
 - Dos plat
 - Le déséquilibre sagittal affecte les articulations sacro-iliaques, hanches, genoux et chevilles
- Op : d'abord hanches si coxarthrose ?

La forme du bassin caractérisée par l'incidence pelvienne détermine la position du plateau sacré et le type de lordose lombaire


$$IP + 9 = LL$$





Messages pour la maison

Personne âgée avec problème de rachis



Drapeaux rouges: investiguer sans attendre

Troubles dégénératifs: corrélation R-C ?

Troubles statiques: réductibles? évolutifs? compensés? neuro (central!) ? spécialistes

Complexité des associations: TD + TS + neuro central

Stratégie ttt selon les caractéristiques du cas particulier et risques/bénéfices

Collaboration multidisciplinaire